

# MECSEER

MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y SERVICIO

## LACTILAC

Pre- mezcla en polvo en base a productos lácteos, leche, suero, aceites, proteínas, complementado con vitaminas, minerales y saborizantes especialmente formulados para terneros en lactancia.

### INGREDIENTES


Productos y subproductos lácteos.	50 %
Aceites vegetales.	22 %
Productos y subproductos de granos de cereales.	12 %
Productos y subproductos de semillas y legumbres.	10 %
Minerales, vitaminas, saborizantes.	6 %

### CRITERIOS FISICO QUIMICOS SOBRE PRODUCTO BRUTO

Humedad.	3,5 % MAX.
Grasa bruta.	12 % MIN.
Proteína bruta.	18 % MIN.
Cenizas bruta.	8,5 % MAX.
Fibra bruta.	0,7 % MAX.
PH.	5,5 – 6,5.
Color.	Crema.
Densidad.	400 g/l. +/- 15 %.



SUSTITUTO LACTEO PARA TERNERO



# MECSEER

MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y SERVICIO

## LACTILAC

Producto elaborado por LACTIN SA para AGROAUSTRAL LTDA y distribuido por MECSEER para CHILE.

Presentación en saco papel KRAFT, multihojas, con funda interior de polietileno transparente, bolsa de 25 Kg.

Número de autorización sanitaria OR675, SERVICIO DE SALUD OSORNO REGIÓN DE LOS LAGOS.  
CERTIFICACIÓN S.A.G.

SUSSTITUTO LACTEO PARA TERNERO

### Recomendación para mezclas.

SUSTITUTO LACTEO PREPARADO (LITROS)	CANTIDAD OPTIMA (KILOS) DE SUSTITUTO	TOTAL LITROS (AGUA)	MINIMO ACEPTABLE (KILOS) DE SUSTITUTO	TOTAL LITROS (AGUA)
1	0,125	0,9	0,100	0,9
2	0,250	1,8	0,200	1,8
3	0,375	2,7	0,300	2,8
4	0,500	3,6	0,400	3,7
5	0,625	4,5	0,500	4,6
6	0,750	5,4	0,600	5,5
7	0,875	6,3	0,700	6,4
8	1,000	7,2	0,800	7,4
9	1,125	8,1	0,900	8,3
10	1,250	9,0	1,000	9,2
20	2,500	18,0	2,000	18,4
30	3,750	27,0	3,000	27,6
40	5,000	36,0	4,000	36,8
50	6,250	45,0	5,000	46,0
60	7,500	54,0	6,000	55,2
70	8,750	63,0	7,000	64,0
80	10,000	72,0	8,000	73,6
90	11,250	81,0	9,000	82,8
100	12,500	90,0	10,000	92,0

### Esquema de alimentación sugerido.

EDAD DEL TERNEO	CALOSTRO Y SUSTITUTO	AGUA/DÍA POR TERNEO	KILOS/HENO POR TERNEO	CONCENTRADO INICIAL
3 - 4 PRIMEROS DÍAS	SOLO CALOSTRO			
DÍA 5 A 14	3 A 3,5 LITROS SUSTITUTO	1-2 LITROS		
DÍA 15 A 12 SEMANAS	4 LITROS DÍA SUSTITUTO	LIBRE CONSUMO	LIBRE CONSUMO	LIBRE CONSUMO

**1** Calcule la cantidad de Litros de sustituto lácteo según el número de terneros que se alimentarán. (Revisar esquema de alimentación).

**2** Mida la cantidad de sustituto indicada en el esquema de mezcla.

**3** Caliente la mitad del agua requerida a 50°C aproximadamente (Se recomienda utilizar termómetro).

**4** Vierta el sustituto lácteo previamente medido en el agua caliente.

**5** Revuelva energicamente con un batidor apropiado por 1 minuto hasta que no se observen grumos.

**6** Agregue el resto de agua fría requerida. Debe lograrse una temperatura óptima final de 35° a 40°C. Medir con termómetro.